

PAUROPODES DE CORSE

Par M^{lle} Micheline LECLERC.

Au cours du voyage qu'il a fait en Corse, en août et septembre 1948, le Professeur P. A. REMY a récolté environ 1.800 Pauropodes que j'ai répartis entre 34 formes dont 3 sont nouvelles et ont été décrites dans une précédente note (LECLERC 1953); je donne ici la liste de toutes ces récoltes qui seront remises au Muséum de Paris.

Liste des stations.

CAP CORSE. — Luri : a) Poggio, au bord de la route, 175 m. ; b) Piazza, friches, 150 m. ¹. — Barrettali : a) entre Stazzona et Torre, jardins, 270-300 m. ; b) Conchiglio, jardin, 120-140 m. — Pietracorbara : Ponticello, 100 m. — Couvent de Sainte-Catherine-de-Sisco, 50 m. — Marine de Sisco, bosquet à Renaggio, 5 m. — Erbalunga, 5 m. — Bastia, ravin de Paratoggio, jardins, 70 m. — Furiani, jardins de Santa Agata, 150 m.

BASSIN DU GOLO. — Ponte Leccia, près du Ponte Rosso, 200 m. — Castiglione, au bord du ruisseau de Terrigola, 550 m. — Francardo, 265 m. — Lano, 400-450 m. — Caporalino, sur le sentier d'Omessa à Castirla, 300 m. — Forêt de Valdoniello, à 800 m. au S.-E. de la Maison forestière de Popaja, 1.100 m.

CORTE. — Jardins sur la rive droite du Tavignano, 400 m.

VENACO. — Serragio et jardin devant la gare, 564-580 m.

VEZZANI. — Bords de la Tagnona, 720 m.

PIETROSO. — Canale et Poggiolo, 630-695 m.

BAS-FIUMORBO. — Près de Saint-Antoine et Ghisonaccia, 20-100 m.

RÉGION D'AJACCIO. — Caldaniccia, 10-16 m. — Basse-Gravona, entre le pont de Cuttoli et l'embouchure du Vardiarelli, 30-60 m. — Pointe de Porticcio, S.-O. de Fallacioli, 15 m.

RÉGION DE SOLENZARA. — Solaro : a) Capra Cotta, 50 m. ; b) Kamiesch, 10 m. — Solenzara : a) fontaine de Pinzutella, 60 m. ; b) au village, 1-20 m. ; c) ravin de Fontanaccia, 2-5 m. ; d) ravin de Minichino, 5 m. ; e) ravin de Calla d'Oro, 10 m. — Togna, ravin, 250 m. — La Penna, jardin, 400 m. — Pont de Cannella, 5 m.

RÉGION DE PROPRIANO. — Santa Maria Figaniella, 500 m. — Fozzano : a) au S.-O. du village, 346 m. ; b) près du tombeau de Colomba, 360 m. — Viggianello, ravin de Mileda, 150 m. — Propriano : a) jardins, 5-40 m. ; b) Capo Lauroso, 15 m. ; c) Bas-Rizzanèze, 20 m.

SARTÈNE. — Jardins, 275-300 m.

1. Les nombres de mètres indiquent l'altitude.

RÉGION DE PORTO-VECCHIO. — Conca, 240 m. — Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, 100 m. — Porto-Vecchio, 2-40 m.

RÉGION DE BONIFACIO. — Bonifacio : a) jardins près de la Marine, 1-8 m. ; b) jardins entre la Marine et le Couvent de Saint-Julien, 20-65 m. — Entre Bonifacio et Gurgazo, jardins, 10-40 m. — Gurgazo, près de la côte, 1 m.

1. Fam. PAUROPIDAE.

1. *Stylopauropus pedunculatus* Lubbock.

Barrettali : a) (3)¹ ; b) (1). — Erbalunga (1). — Furiani (7). — Francardo (3). — Lano (5). — Caporalino (5). — Popaja (3). — Corte (2). — Venaco (2). — Vezzani (1). — Bas Fiumorbo (23). — Caldaniccia (4). — Basse-Gravona (30). — Porticcio (2). — Solenzara (8). — La Penna (5). — Pont de Cannella (1). — Santa Maria Figaniella (2). — Fozzano (2). — Viggianello (1). — Propriano : a) (15) ; c) (4). — Sartène (10). — Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (5). — Porto-Vecchio (9). — Bonifacio : a) (15) ; b) (3). — Entre Bonifacio et Gurgazo (2). — En tout 174 ind. : 84 à 9 pp. (43 ♂, 26 ♀, 15 sexe ?), 39 l. à 8 pp. (13 ♂, 9 ♀, 17 sexe ?), 25 l. à 6 pp., 17 l. à 5 pp., 9 l. à 3 pp.

2. *Stylopauropus pubescens* Hansen.

Barrettali : a) (1). — Erbalunga (2). — Bastia (2). — Furiani (12). — Basse-Gravona (1). — Sartène (1). — En tout 19 ind. : 12 à 9 pp. (7 ♂, 4 ♀, 1 sexe ?), 4 l. à 8 pp. (2 ♂, 1 ♀, 1 sexe ?), 1 l. à 6 pp., 1 l. à 5 pp., 1 l. à 3 pp.

3. *Pauropus furcifer* Silvestri.

Venaco (2). — Pietroso (2). — Basse-Gravona (7). — Solaro : b) (2). — Solenzara : b) (10). — Pont de Cannella (3). — Santa Maria Figaniella (1). — Propriano : a) (2) ; b) (2). — Sartène (1). — Conca (1). — Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (1). — En tout 34 ind. : 11 à 9 pp. (4 ♂, 3 ♀, 4 sexe ?), 7 l. à 8 pp. (1 ♂, 1 ♀, 5 sexe ?), 7 l. à 6 pp., 5 l. à 5 pp., 4 l. à 3 pp.

4. *Allopauropus danicus* Hansen.

Sainte-Catherine-de-Sisco (1). — Corte (2). — Bas-Fiumorbo (1). — Caldaniccia (8). — Basse-Gravona (1). — Solenzara : b) (1). — Fozzano : b) (1). — Propriano : a) (4). — Sartène (4). — Porto-Vecchio (7). — Bonifacio : a) (2). — Gurgazo (3). — En tout 35 ind. : 12 à 9 pp. (8 ♂, 2 ♀, 2 sexe ?), 3 l. à 8 pp. (2 ♀, 1 sexe ?), 6 l. à 6 pp., 9 l. à 5 pp., 5 l. à 5 pp.

1. Les nombres mis entre parenthèses après l'indication de la station sont ceux des individus récoltés en celle-ci.

Abbreviations : ind. à ... pp. = individu à ... paires de pattes locomotrices ; l. à ... pp. = larve à ... paires de pattes locomotrices ; sexe ? = sexe non reconnu.

5. *Allopauropus Zerlingae* Remy.

Marine de Sisco (1). — Basse-Gravona (2). — Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (1). — En tout 4 ind. à 9 pp. (2 ♂, 2 ♀).

6. *Allopauropus brevisetus* Silvestri.

Luri : b) (4). — Ponte-Leccia (2). — Popaja (21). — Basse-Gravona (1). — En tout 28 ind. : 6 à 9 pp. (1 ♂, 5 ♀), 1 l. à 8 pp. sexe ?, 6 l. à 6 pp., 14 l. à 5 pp., 1 l. à 3 pp.

7. *Allopauropus furcula* Silvestri.

Sainte-Catherine-de-Sisco (1). — Marine de Sisco (2). — Furiani (1). — Ponte-Leccia (2). — Castiglione (8). — Bas-Fiumorbo (24). — Caldaniccia (1). — Basse-Gravona (4). — Solenzara : b) (6). — Fozzano : a) (11). — Viggianello (5). — Propriano : a) (43) ; c) (3). — Sartène (1). — Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (3). — En tout 115 ind. : 71 à 9 pp. (28 ♂, 31 ♀, 12 sexe ?), 18 l. à 8 pp. (1 ♂, 6 ♀, 11 sexe ?), 10 l. à 6 pp., 16 l. à 5 pp.

8. *Allopauropus productus* Silvestri.

Luri : b) (7). — Marine de Sisco (1). — Bas-Fiumorbo (11). — Basse-Gravona (41). — Solaro : a) (2). — Solenzara : b) (1). — Santa Maria Figaniella (12). — Viggianello (19). — Propriano : a) (15) ; b) (7) ; c) (9). — Bonifacio : b) (1). — Gurgazo (9). — En tout 135 ind. : 1 à 10 pp. ♀, 86 à 9 pp. (42 ♂, 36 ♀, 8 sexe ?), 15 l. à 8 pp. (8 ♂, 1 ♀, 6 sexe ?), 19 l. à 6 pp., 7 l. à 5 pp., 7 l. à 3 pp.

9. *Allopauropus aristatus* Remy.

Venaco (2). — Basse-Gravona (2). — Solenzara : c) (1). — Bonifacio : a) (1) ; b) (8). — En tout 14 ind. : 7 à 9 pp. (4 ♀, 3 sexe ?), 2 l. à 8 pp. sexe ?, 1 l. à 6 pp., 4 l. à 3 pp.

10. *Allopauropus pectinatus* Hansen.

Luri : b) (8). — Barrettali : a) (1) ; b) (4). — Furiani (2). — Entre Bonifacio et Gurgazo (1). — En tout 16 ind. : 15 à 9 pp. (2 ♂, 9 ♀, 4 sexe ?), 1 l. à 8 pp. sexe ?

11. *Allopauropus helveticus* Hansen var. *obtusicornis* Remy.

Barrettali : a) (1). — Furiani (2). — La Penna (1). — Propriano : a) (3) ; c) (1). — Sartène (2). — Porto-Vecchio (1). — En tout 11 ind. : 7 à 9 pp. (5 ♂, 2 ♀), 3 l. à 8 pp. (1 ♀, 2 sexe ?), 1 l. à 6 pp.

12. *Allopauropus Denisi* Remy.

Popaja (5). — Basse-Gravona (15). — Solenzara : a) (2). — La Penna (1). — Santa Maria Figaniella (1). — Viggianello (2). — Propriano : a) (8) ;

c) (5). — Sartène (7). — Conca (2). — Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (1). — En tout 49 ind. : 44 à 9 pp. (24 ♂, 20 ♀, 4 l. à 8 pp. (2 ♂, 2 ♀), 1 l. à 5 pp.

13. *Allopauropus vulgaris* Hansen.

Luri : a) (2). — Barrettali : b) (23). — Ponte-Leccia (4). — Castiglione (8). — Lano (3). — Caporalino (1). — Popaja (2). — Venaco (8). — Pictroso (2). — Bas-Fiumorbo (2). — Caldaniccia (2). — Basse-Gravona (34). — Solaro : a) (1). — Solenzara : b) (1) ; c) (1) ; d) (3). — Togna (10). — La Penna (3). — Santa Maria Figaniella (22). — Propriano : b) (26). — Sartène (17). — Conca (6). — Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (9). — En tout 186 ind. : 145 à 9 pp. (42 ♂, 67 ♀, 36 sexe ?), 11 ind. à 8 pp. (1 ♂, 3 ♀, 4 sexe ?), 24 l. à 6 pp., 5 l. à 5 pp., 1 l. à 3 pp.

14. *Allopauropus corsicus* Remy.

Castiglione (1). — Vezzani (2). — Caldaniccia (3). — Basse-Gravona (20). — Solenzara : b) (2). — Propriano : c) (1). — Sartène (7). — Bonifacio : b) (1). — En tout 37 ind. : 31 à 9 pp. (16 ♂, 13 ♀, 2 sexe ?), 3 l. à 8 pp. (1 ♀, 2 sexe ?), 3 l. à 6 pp.

15. *Allopauropus spinosus* Leclerc.

Bonifacio : b) 1 ind. à 8 pp. sexe ?

16. *Allopauropus Ribauti* Remy.

Caldaniccia (4). — Basse-Gravona (1). — Solaro : a) (3). — Porto-Vecchio (8). — Bonifacio : b) (1). En tout 17 ind. : 10 à 9 pp. (7 ♀, 3 sexe ?), 1 l. à 8 pp. sexe ?, 4 l. à 6 pp., 1 l. à 5 pp., 1 l. à 3 pp.

17. *Allopauropus Ludovicae* Remy.

Bonifacio : b) 3 ind. à 9 pp. (1 ♂, 2 ♀).

Les 3^e trichobothries n'avaient pas été vues chez le type. Leur axe, grêle dans la région du bulbe, s'épaissit progressivement jusqu'à la moitié de la soie où il atteint son diamètre définitif ; il est terminé distalement par une boule, ovoïde à pubescence courte, inclinée vers l'extrémité distale ; l'axe porte une pubescence analogue dans sa partie proximale, plus longue et plus abondante dans sa partie distale.

18. *Allopauropus barcinonensis* Remy.

Basse-Gravona : 3 ind. : 2 à 9 pp. ♀, 1/l. à 5 pp.

19. *Allopauropus Hessei* var. *insulanus* Remy.

Luri : b) (2). — Barrettali : a) (4) ; b) (12). — Erbalunga (1). — Furiani (5). — Basse-Gravona (1). — En tout 25 ind. : 11 à 9 pp. (3 ♂, 4 ♀, 4 sexe ?), 8 l. à 8 pp. (3 ♂, 3 ♀, 2 sexe ?), 3 l. à 6 pp., 2 l. à 5 pp., 1 l. à 3 pp.

20. *Allopauropus therapnaeus* Leclerc.

Caldaniccia : 1 ind. à 9 pp. ♀.

21. *Allopauropus gracilis* Hansen var. *sabaudianus* Remy.

Luri : b) (4). — Barrettali : a) (7). — Sainte-Catherine-de-Sisco (5). — Ponte Leccia (13). — Castiglione (2). — Francardo (1). — Venaco (4). — Pietroso (1). — Bas-Fiumorbo (1). — Basse-Gravona (4). — Porticcio (2). — Solaro : a) (3). — Solenzara : b) (10) ; d) (1). — La Penna (6). — Pont de Cannella (3). — Propriano : a) (20) ; c) (26). — Sartène (6). — Conca (3). — Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (2). — Porto-Vecchio (28). — Bonifacio : a) (7) ; b) (41). — Entre Bonifacio et Gurgazo (11). — Gurgazo (4). — En tout 198 ind. : 5 à 10 pp. ♀, 140 à 9 pp. (44 ♂, 62 ♀, 34 sexe ?), 21 l. à 8 pp. (6 ♂, 2 ♀, 13 sexe ?), 16 l. à 6 pp., 11 l. à 5 pp., 5 l. à 3 pp.

22. *Allopauropus gracilis* var. *sequanus* Remy.

Luri : a) (1) ; b) (3). — Barrettali : a) (9). — Pietracorbara (1). — Marine de Sisco (4). — Furiani (11). — Ponte-Leccia (29). — Francardo (6). — Lano (3). — Popaja (3). — Corte (3). — Venaco (10). — Vezzani (25). — Pietroso (5). — Bas-Fiumorbo (2). — Caldaniccia (1). — Basse-Gravona (31). — Porticcio (14). — Solaro : a) (1) ; b) (3). — Solenzara : a) (3) ; b) (21) ; c) (3) ; d) (4) ; e) (1). — Togna (18). — La Penna (32). — Pont de Cannella (5). — Santa-Maria Figaniella (7). — Viggianello (4). — Propriano : a) (32) ; c) (22). — Sartène (20). — Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (9). — Porto-Vecchio (14). — Bonifacio : a) (27) ; b) (75). — Gurgazo (11). — En tout 473 ind. : 1 à 10 pp. ♀, 358 à 9 pp. (125 ♂, 132 ♀, 101 sexe ?), 39 l. à 8 pp. (6 ♂, 9 ♀, 24 sexe ?), 46 l. à 6 pp., 21 l. à 5 pp., 8 l. à 3 pp.

23. *Allopauropus gracilis* var. *sinuatus* Remy.

Solenzara : b) 4 ind. : 1 à 9 pp. ♀, 1 l. à 8 pp. ♀, 2 l. à 6 pp.

24. *Allopauropus meridianus* Remy.

Solenzara : b) (1). — Propriano : a) (1) ; c) (2). — Gurgazo (1). — En tout 5 ind. à 9 pp. (2 ♂, 2 ♀, 1 sexe ?).

Dans la diagnose originale, les poils des 9^e pattes locomotrices n'ont pas été décrits ; les poils coxaux et trochantériens sont bifurqués ; le poil proximal du tarse, inséré à peu près au 1/3 de cet article, est égal aux 2/7 de la longueur de celui-ci.

Chez les individus étudiés ici, le tergum pygidial présente un lobe médian subtriangulaire à sommet arrondi ; ce lobe est peu proéminent chez le type. Les cornes latérales de la plaque anale sont moins divergentes que chez le type.

25. *Allopauropus Cordieri* Remy.

Propriano : a)ⁿ1 ind. à 9 pp. ♂.

L'axe des 3^e trichobothries est atténué à chaque extrémité, mais bien plus du côté distal que proximal, ce qui n'est pas le cas chez *A. Amaudruti* Remy. Avec P. REMY, qui a examiné ce spécimen corse, j'estime que ce caractère est assez important pour considérer *Cordieri* comme une espèce, et non une variété d'*A. Amaudruti*. La pubescence de ces soies est courte et raide, penchée vers l'extrémité distale.

26. *Allopauropus maurus* Remy.

Gurgazo : 3 ind. à 9 pp. (2 ♂, 1 sexe ?).

(A suivre).

Laboratoires de Zoologie du Muséum
et de la Faculté des Sciences de Nancy.